

FICHA TECNICA DE SANITIZANTE

DESCRIPCION:

Es un producto tensoactivo catiónico, con características antisépticas y bactericidas de gran fuerza.

Se encuentra formulado a base de sales cuaternarias de amonio.

BENEFICIOS:

Es un producto completamente soluble al agua, formulado para desinfectar tanto superficies rugosas como lisas.

Gran poder desinfectante, tiene las funciones de fungicidas, algicida y virucida, aún en soluciones diluidas.

En solución no es corrosivo para los materiales

APLICACIÓN:

De gran utilidad en la industria de alimentos, comedores y restaurantes, para la desinfección de equipos o utensilios de cocina, superficies de acero inoxidable, mesas de trabajo, en materiales de granito para área panaderías, azulejos, entre otros.

Úselo para la desinfección de huevo fértil, pisos, paredes, salas de nacimiento, incubadoras, cuarentena y hospitales.

Útil en la desinfección de comedores, ambulancias, bebederos, charolas, rodetes equipo y vehículos en general

INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

Por medio de Aspersión

Limpiar la superficie con un jabón detergente

Enjuagar y dejar escurrir o secar con una toalla de papel

Con un atomizador utilizar la dilución de acuerdo a la superficie o utensilio a desinfectar

Permita que el producto actúe de acuerdo a la tabla siguiente, dependiendo de la superficie o utensilio a desinfectar. Deje secar, no es necesario el enjuague

AREA	ML PRODUCTO/ML AGUA	PMM	TIEMPO DE CONTACTO CON LA SUPERFICIE
Equipo o utensilios de cocina	10ml. Sanitizante/1000ml. Agua	100-200	8 Min.
Tablas de picar en carnicerías	20ml. Sanitizante/1000ml. Agua	300-400	10 Min.
Superficies lisas	10ml. Sanitizante / 1000ml. Agua	100-200	8 Min.
Superficies rugosas o porosas	20ml. Sanitizante / 1000ml. Agua	300-400	10 Min.
Paredes, techos, pisos, mesones y otras superficies, de restaurantes, cocinas, baños, hogares	10ml. Sanitizante / 1000ml. Agua	100-200	8 Min.

POR INMERSION:

Es importante que se haya realizado un lavado previo con agua y jabón para retirar restos de materia orgánica y hacer más eficiente el desempeño de sanitizante en los utensilios y tablas de corte.

Sanitice por inmersión usando sanitizante con un tiempo de 10 a 15 minutos

Sacar de la tarja y dejar escurrir, secar al aire

AREA	ML PRODUCTO/ML AGUA	PMM	TIEMPO DE CONTACTO CON LA SUPERFICIE
Equipo o utensilios de cocina	10ml. Sanitizante/1000ml. Agua	100-200	10-15 Min.
Tablas de picar en carnicerías	20ml. Sanitizante/1000ml. Agua	300-400	15-20 Min.

PARAMETROS DE CALIDAD:

Color: Incolora

Olor: Característico

Apariencia: Liquida

Solubilidad en agua: 100% Soluble

PH: 6-8

Densidad: 0.900-1.00

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consulte la hoja de datos de seguridad. Cuando maneje este producto utilice el equipo de protección personal adecuado.

No se deje al alcance de los niños. En caso de contacto con la piel y ojos puede causar irritación, lave con abundante agua, si la irritación persiste consulte a su médico.

El producto NO es toxico ni irritante siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso. Por ingestión accidental NO provoque el vómito y consulte a su médico. Manténgase en un lugar fresco y seco.

EN CASO D EINGESTION:

Consulte inmediatamente al medico

BACTERIA	VIRUS	HONGOS	TIPO DE CONTACTO
Acinetpbacter cailoaceticus	Adenovirus tipo 4	Aspergillus niger	10 min
Bordetella bronchiseptica	Virus hepatitis B (VHB)	Candida albicans	10 min
Chialmydia psittaci	Virus hepatitis C (VHB)	Trichophuyton mentagrophytes	10 min
Enterobacter aerogenes	Herpes simple tipo 1		10 min
Enterobacter cloacae	Herpes simple tipo 2		10 min
Enterococofaecalis-VRE (resistente a la vancomicina)	VIH-1 (VIRUS sida)		10 min
Escherichia coli fosoacterium necrophorum	Coronavirus humano		10 min
Kiebsiella pneumeniae	Influenza A/hongo Kong		10 min
Legionella pneumophilia	Vaccinia		10 min
Literia monocytogenes	Rubeola (sarampión)		10 min
Pasteurella multocida	Virus respiratorios sincitial (VRS)		10 min
Proteus mirabiles	Virus animales: Poliomavirus aviar		10min
Proteus vulgaris	Moquillo		10min
Pseudomonas aeruginosa	Leucemia felina		10 min
Salmonella choleraesuis	Picornarivirus felino		10 min

Salmonella enteritidis	Rinotraqueitis boina infecciosa		10 min
Salmonella typha	Bronquitis infecciosa (BVI aviar)		10 min
Salmonella typhimurium	Psudorabia (VPR)		10 min
Serratia marcescens	Rabia Gastroenteritis transmisible (TGE)		10 min
Shigella flexneri			10 min
Shigella sonnei			10 min
Staphylococo aureus			10 min
Staphylococo aureus-MRSA(resistente a la meticilina)			10 min
Staphylococo aureus-VISA (resistente intermedio a vancomicina)			10 min
Streptococo faecalis y/o pyogenes			10 min

